

## خاستگاه کانیایی اسکارن‌های گنبد نمکی زندان، استان هرمزگان

مریم شهری، سیدمحسن مرتضوی\*، عبدالرحیم هوشمندزاده

گروه زمین‌شناسی، دانشکده فارابی، دانشگاه هرمزگان

(دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۲/۱۱، نسخه نهایی: ۱۴۰۰/۵/۱۲)

**چکیده:** سازند هرمز در گنبدنمکی زندان، با سن کامبرین پیشین- نئوپروتوزویک در نزدیکی بندرلنگه، غرب استان هرمزگان واقع شده است. اسکارن‌های کلسیمی آهن‌دار در نزدیکی توده‌های آذرین بازی دارای نهشته مس در این گنبدنمکی دیده می‌شوند. سنگ‌میزبان این اسکارن‌ها شامل توالی رسوبی آواری-کربناتی، توفیت‌های کربناتی و سنگ‌های آذرین است. مجموعه سیلیکات‌های آهکی شاخص در درون اسکارن‌ها شامل گارنت‌های نوع گراندیت (آندرادیت-گروسولار)، فلدسپارها، کلینوزویت، اکتینولیت، ولاستونیت و وزوویانیت هستند. مجموعه سیلیکات‌های آهکی در برون اسکارن‌های گارنت بیشتر از نوع آندرادیت، اپیدوت، اکتینولیت و ولاستونیت هستند. بر اساس تجزیه ریز پردازشی، طیف ترکیب گارنت‌ها از  $And_{30}Gross_{70}$  تا  $And_{100}Gross_0$  متغیر است. بررسی شیمی بلور نشان می‌دهد که توزیع عناصر فلزی چون Cu، Mn و Zn در درون اسکارن‌ها و برون اسکارن‌ها به طور اصولی تغییر می‌کنند. بررسی سیال‌های درگیر از کانی آندرادیت نشان می‌دهد که این اسکارن‌ها در دمای ۶۰۰ تا ۶۵۰ درجه سانتیگراد تشکیل شده‌اند.

واژه‌های کلیدی: اسکارن‌های کلسیمی آهن‌دار؛ گراندیت؛ ولاستونیت؛ سیال‌های درگیر؛ گنبدنمکی زندان.

## مقدمه

نزدیک به ۲۰۰ عدد گنبد نمکی در جنوب ایران رخنمون یافته‌اند که در مرز بین دو گسل کازرون و میناب بر اثر فازهای کششی رخداد کوه‌زایی کاتانگایی ایجاد شده‌اند. این فاز کوه‌زایی منجر به انباشته شدن رسوب‌های تبخیری، کولابی به همراه روانه‌های آذرین شده است [۱]. هر گنبد نمکی شامل یک هسته مرکزی نمکی و سنگ‌های دربرگیرنده آن یا پوش سنگ است. سنگ‌های دربرگیرنده، شامل مجموعه‌ای از سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی- دگر نهاده هستند. این گنبدها اغلب گروه فارس را قطع کرده و سر برافراشته‌اند. در بیشتر گنبدهای نمکی، سطح بالایی با طبقه‌هایی از سنگ‌های رسوبی پوشیده شده‌اند که از هسته مرکزی جوانتر هستند. این سنگ‌ها ستبرای پوش سنگ گنبدهای نمکی هستند که ضخامت آنها گاهی به چند صد متر می‌رسد و با رسوب‌های نمکی هرمز به شکل مجموعه سنگی یا سری شناخته می‌شوند.

تراشکافت نمکی زندان از گنبدهای نمکی جنوب ایران

است که در آن اسکارن‌های کلسیمی آهن‌دار وجود دارند. اسکارن‌های کلسیمی آهن‌دار در برخی از گنبدهای نمکی و گنبدنمکی زندان در نزدیکی بندرلنگه دیده شده و کمتر بررسی شده‌اند. این اسکارن‌ها گاهی با توده‌ای از سنگ‌های معدنی فلزی چون آهن و مس همراه هستند.

از بررسی‌های انجام شده بر این گنبدنمکی می‌توان به پژوهش بیابانگرد و همکاران اشاره کرد [۲]. آنها با نگرش زمین‌شناسی اقتصادی، کانی‌شناسی، زمین شیمی و خاستگاه کانه‌زایی آهن و مس در توالی آتشفشانی- رسوبی گنبدنمکی زندان را بررسی کرده و آنها را از نوع سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد، VMS، معرفی کردند [۳، ۲]. بر پایه پژوهش عطاپور و آفتابی [۴]، پیرامون کانی‌سازی آهن در این گنبد، کانه‌زایی آهن از نوع راپیتان است. در این پژوهش برای نخستین بار اسکارن‌های آهن و در گنبدهای نمکی جنوب ایران خاستگاه آن‌ها معرفی می‌شود.

گنبد نمکی زندان در ۸۰ کیلومتری شمال شهرستان

\*نویسنده مسئول، تلفن: ۰۷۶۳۳۷۱۱۰۰۰، پست الکترونیکی: hsm\_mortazavi@yahoo.co.uk


بندرلنگه و ۱۱۰ کیلومتری غرب شهرستان بندرخمیر در استان هرمزگان قرار دارد. مهمترین راه دسترسی به گنبد نمکی زندان جاده بندرعباس - بندرخمیر - بندرلنگه است.

### زمین‌شناسی و روابط صحرایی

گنبد های نمکی از پدیده های ویژه زمین‌شناسی در جنوب ایران هستند. به طور کلی، سری هرمز نظم چینه ای ندارد و به چهار عضو H1, H2, H3 و H4 تقسیم شده است. واحد اصلی نمک هرمز، H1، نزدیک به ۶ کیلومتر در عمق بوده و با سنگ های رسوبی پوشانده شده است [۵-۹]. گنبد نمکی زندان شامل سنگ های تبخیری چون سنگ گچ و انیدریت و اغلب همراه با کربنات های سیاه رنگ بدبو، ماسه سنگ ها و سنگ های آتشفشانی اسیدی تا بازی است [۱۰، ۱۱]. سنگ گچ های برشی شده اغلب در لبه گنبد یافت می شوند و رنگ آن ها بستگی به سنگ های کنار آنها دارد که شیل های سیاه و دولومیت ها تنها در بخش شمال غربی این گنبد یافت می شوند. سنگ های آهکی با رنگ روشن تر همراه با مارن های بین لایه ای هستند که در جنوب شرق وجود دارند. سه توالی سنگ شناسی در این گنبد

نمکی قابل تشخیص هستند: ۱) شیل های دگرسان شده همراه با لای سنگ و ماسه سنگ های خاکستری تا بنفش، ۲) شیل های قرمز همراه با ماسه سنگ های سبز و سنگ های آتشفشانی که در یک محیط دریایی کم عمق ته نشین شده اند و ۳) شیل های سبز و قرمز با میان لایه های ماسه سنگی که به احتمال بسیار این لایه ها توالی انتقالی بین دو توالی پیشین هستند [۱۲]. در شمال این گنبد و در بخش شرقی تاقدیس، گچ در تماس با سازند میشان قرار دارد. در قسمت جنوبی، ساختار ناودیدی در سنگ های رسوبی دیده می شود که در تماس با سازند آغا جاری است.

گنبد نمکی زندان مانند دیگر گنبدها طی صعود، رسوب - های سنوزوئیک کناری را چین داده است [۱۳]. سنگ های رسوبی و آتشفشانی - رسوبی، گاهی تا ۹۰ درجه شیب دار، و در اثر عوامل زمین ساختی خرد شده و بر واحدهای تبخیری گنبد فرو ریخته اند. شرایط فشار همراه با بالا آمدن گنبد نمک، افزون بر خردشدگی سنگ های رسوبی پوش سنگ، منجر به دگرگونی - های درجه پایین شده است (شکل ۱).



شکل ۱ گنبد های نمکی جنوب ایران و منطقه مورد بررسی واقع در گنبد نمکی زندان [۱۳].

## روش کار

به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، پس از مطالعه اسناد موجود و تصاویر ماهواره‌ای و پیمایش‌های صحرایی، تعداد ۲۰ مقطع نازک و نازک صیقلی تهیه شده و با میکروسکوپ قطبشی بررسی سنگ‌نگاری شدند. سپس، این نمونه‌ها برای بررسی شیمی بلور به آزمایشگاه کانساران بینالود ارسال شدند. آنها با روش‌های پراش پرتوی ایکس (XRD)، طیف‌سنجی فلئورسانس پرتوی ایکس (XRF) و با ریزپردازشگر پرتوی ایکس XGT-7200 برای ۵۰ نقطه از کانی‌های اسکارنی تجزیه شدند. افزون بر این برای دماسنجی اسکارن‌ها، سیال‌های درگیر در گارنت‌های موجود بررسی شدند.

## سنگ‌شناسی

گنبد نمکی زندان مانند سایر گنبدهای نمکی جنوب ایران شامل واحدهای آذرین، دگرگون و رسوبی است که برخی از سنگ‌ها وابسته به مجموعه هرمز و برخی مربوط به واحدهای سنوزوئیک زاگرس (میشان، آقاجاری و بختیاری) هستند. نمک به عنوان قدیمی‌ترین واحد سری هرمز تنها در برخی مناطق این گنبد نمکی بروز دارد. واحدهای زیرین مارن‌هایی با لایه‌های غنی از هماتیت، هستند که به صورت دگرشیب در زیر همه واحدها قرار دارند (شکل ۲ ب) و در بخش‌هایی دارای لایه‌های انیدریتی هستند. لایه‌های مارن، انیدریت، توف ریولیتی و توده‌های حدواسط تا بازی (شکل ۲ الف)، دولومیت-های قرمز، زرد و خاکستری در گنبدنمکی دیده می‌شوند. در سال‌های اخیر مشخص شده است که سنگ‌های رسوبی سری هرمز در اثر فرایندهای گرمایی و دگرگونی گاه تمام بلورین شده و بافت‌های نواری در آن‌ها دیده می‌شود. آهک‌های دولومیتی زرد رنگ در کنار مارن‌های قرمز سنگ گچ‌دار از بخش H1 سری هرمز مشاهده می‌شود (شکل ۲ پ). این آهک‌ها گاهی دارای فعالیت‌های باکتریایی هستند یا به توالی ماسه‌سنگی توفیتی می‌رسند.

توده‌های آذرین با ترکیب‌های حدواسط و بازی، به صورت توده‌های کوچک پراکنده وجود دارند که در کنار واحدهای کربناتی هستند و بر واحد مارنی سنگ گچی قرار دارند. طیف ترکیبی آن‌ها شامل دیاباز، میکروگابرو، کوارتز دیوریت و گاهی بازالت است. توده‌های بازی در گنبدنمکی زندان با کانسارهای مس همراه هستند. اپیدوتی شدن، کلریتی و هماتیتی شدن از

ویژگی‌های بارز آن‌ها هستند. کانسارهای آهن بیشتر در سنگ‌های رسوبی وجود دارند. قطعه سنگ‌های اسیدی با دگرسانی شدید به شکل قطعه‌های سرگردان نیز در میان کربنات‌ها دیده شده‌اند (شکل ۲ ب). ترکیب‌های دیده شده در این قطعه‌های سنگی شامل ریوداسیت، گرانیت و توف ایگنیمبریت با شکل نواری هستند که گاهی بر اثر دگرسانی هماتیتی و مگنتیتی شده‌اند و کانی‌های آهنی از جمله پیریت در آن‌ها دیده می‌شود. سنگ میزبان همراه با آن‌ها به شکل قطعه‌های سنگی شامل قطعه‌های آهکی و کنگلومرایی با دگرسانی شدید همه از مجموعه هرمز دیده شده است.


## بحث

## اسکارن و کانی‌زایی


اسکارن به عنوان سنگی آهکی سیلیکاتی و همراه با کانسارهای فلزی معرفی شده است که می‌تواند برای بررسی ذخایر همراه آنها بسیار ارزشمند باشد. اسکارن آهن در گنبد نمکی زندان بین‌لایه‌ای و به شکل عدسی و کمتر به صورت رگه‌ای در سنگ‌های میزبان دیده می‌شود (شکل ۲ ت). بررسی‌های صحرایی نشان می‌دهد که بیشتر واحدهای اسکارنی با رخنمون‌های کمی سالم به صورت قطعه‌ها و لایه‌های سنگی بر بخش مارنی سنگ گچی قرار دارند. این اسکارن‌ها، در نزدیکی دیابازهای مس‌دار و درون سنگ‌های کربناتی یافت شده‌اند (شکل ۳) و دارای کانی‌های فراگرمایی و گاه فلز طبیعی مس به همراه اپیدوت هستند. کربنات‌های مس از جمله ملاکیت و سولفیدهای مس مانند کالکوپیریت در این ذخیره یافت می‌شوند.

کانی‌سازی در سنگ‌های اسکارنی به دو شکل دیده می‌شود. یکی در فضاها باز سنگ‌ها که در آن کانی‌ها بیشتر به صورت بلورهای شکل‌دار هستند و دیگری درون سنگ میزبان که بیشتر دسته‌های کانی را به شکل‌های نواری لایه‌ای می‌توان مشخص کرد. عواملی چون ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سنگ میزبان و میزان نفوذ سیال‌ها به درون رسوب‌های آهکی شکل کانی‌زایی در این اسکارن‌ها را کنترل می‌کنند. با توجه به حضور سیلیکات‌های آهکی آهن‌دار در سنگ‌های رسوبی آهکی شرق گنبد نمکی زندان، دو نوع اسکارن قابل تشخیص است؛ درون اسکارن‌ها در لبه توده‌های آذرین و در توفیت‌ها و برون اسکارن‌ها در سنگ‌های رسوبی آهکی پیرامون توده قرار دارند.





شکل ۲ الف- مرز بین توده کوارتز دیوریتی و مارن‌های برشی شده. ب- قطعه سنگ‌های آذرین اسیدی سرگردان در کربنات‌ها با دگرسانی شدید. پ- توالی مارن برشی شده سنگ گچ در تماس با آهک‌های دولومیتی نازک لایه زرد رنگ. ت- گارنت به صورت بین لایه‌ای و عدسی شکل در لایه‌های ماسه سنگی.




شکل ۳ بخشی از نقشه زمین‌شناسی یکصد هزار بندرلنگه و موقعیت اسکارن‌ها در گنبد نمکی زندان به همراه نقشه زمین‌شناسی 1:20000.

## برون اسکارن‌ها


برون اسکارن‌ها در سنگ‌های میزبان ماسه‌سنگی، کنگلومرای و آهکی دولومیتی زردرنگ در کنار کانسار آهن دیده می‌شوند. سنگ‌ها در برون اسکارن دارای منطقه‌بندی شیمیایی و لایه-بندی به رنگ‌های مختلف هستند. این اسکارن‌ها بیشتر شامل بخش‌های غنی از آندرادیت به رنگ سیاه، بخش‌های اکتینولیت‌دار به رنگ سبز تیره و بخش‌های اپیدوت‌دار به رنگ سبز روشن هستند (شکل ۴). سایر کانی‌های دیده شده در ادامه شرح داده می‌شوند.

**تیتانیت:** تیتانیت ( $\text{CaTiSiO}_5$ ) به همراه آندرادیت ( $\text{Ca}_3\text{Fe}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$ ) در برخی از سنگ‌های متاکربناتی دیده می‌شود. در تصویر میکروسکوپی، بلورهای گوه‌ای شکل آن در لبه بلور آندرادیت تشکیل شده‌اند (شکل ۵ الف). واکنش



احتمالی تیتانیت‌ها در برون اسکارن همراه با آندرادیت بصورت زیر است:



**گارنت:** گارنت‌های نوع گراندیت که ترکیبی بین آندرادیت و گروسولار دارند، به رنگ‌های سیاه، سرخ، قهوه‌ای و گاهی سبز در برون اسکارن‌ها دیده شده‌اند. گارنت‌ها اغلب با اکتینولیت و کوارتز همراه می‌شوند و با اپیدوت‌ها به شکل انبوهه در کنار هم هستند. کانی پیروکسن به احتمال بسیار در مراحل اولیه اسکارن‌زایی (مرحله تشکیل کانی‌های بی‌آب) به وجود آمده اما به تدریج به خرج گارنت‌ها کاهش یافته است (شکل ۶ الف). بقایای بسیار کم پیروکسن در برخی از گارنت‌ها باقیمانده است.




**شکل ۴ الف-** تشکیل آندرادیت در برون اسکارن به همراه نوارهای کوارتزی در سنگ کربنات. این گارنت‌ها دربردارنده میانبارهای تیتانیت هستند (مقطع میکروسکوپی آن در شکل ۵ نشان داده شده است). ب- نمونه سنگ برون اسکارن با نوارهایی غنی از گارنت + اپیدوت + آمفیبول و بخش‌های دارای ولاستونیت + کلسیت و کوارتز.



**شکل ۵ الف-** گارنت درشت دارای منطقه‌بندی ترکیبی متفاوت در دو ضخامت رشدیافته در لبه آن. حضور میانبارهای تیتانیت و آمفیبول در لبه این کانی. ب) گارنت‌های شکل‌دار به همراه اکتینولیت و کانی‌های کدر. گارنت گاهی دستخوش نفوذ سیلیس در مرحله پسروده شده است تصاویر در نور قطبیده متقاطع (xpl) تهیه شده اند.





شکل ۶ الف- گارنت نوع آندرادیت با بقایایی از دیوپسید و میانبرهای اکتینولیت و اپیدوت در بلور درشت آن در نور قطبیده صفحه ای، (Ppl). در این سنگ، گارنت به خرج پیروکسن و کلسیت تشکیل شده است، ب- تشکیل گارنت بدون منطقه‌بندی در گارنت اپیدوت اسکارن. سنگ حالت مرمری دارد (Xpl)، پ- مرز بین آندرادیت و زمینه سنگ لای دار. دانه‌های کوارتز با بافت دندانه دار به همراه رگچه‌های فراوان از کلسیت (Xpl) و ت- حضور رگه‌ها و رگچه‌های کلسیت و کوارتز در گارنت (Xpl).

نفوذی دیده شده است. در این سنگ‌ها، گارنت‌های گراندیتی خودشکل درشت به قطر ۲ سانتی‌متر همراه با اپیدوت‌های شکل‌دار یافت می‌شوند.

چنان‌که دیده می‌شود، گارنت از کانی‌های اصلی در برون-اسکارن‌هاست که گاهی به تنهایی در حفره‌های سنگ‌ها تشکیل می‌شود. گارنت‌هایی نیز همراه با رگچه‌های کلسیتی و کوارتز یافت شده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده نفوذ سیال‌های تاخیری به درون سنگ باشد.

**اپیدوت:** اپیدوت‌های بسیاری در سه محیط کانی‌زایی درون-اسکارن، برون‌اسکارن و محیط نهشت سیال‌های گرمابی حضور دارند. آن‌ها بسته به اینکه از سیال‌های آگازین یا پایانی متبلور شده باشند، مانند گارنت‌ها ترکیب‌ها و رنگ‌های متفاوتی دارند. **ولاستونیت:** از دیگر کانی‌های موجود در سنگ‌های برون‌اسکارن و نیز درون‌اسکارن ولاستونیت است. ولاستونیت به شکل بلورهای بسیار ریز کشیده و بی‌رنگ همراه با کلسیت و کوارتز سبز دیده می‌شود. ولاستونیت نشان‌دهنده شرایط وجود


آمفیبول‌های سری اکتینولیت-ترمولیت همراه با گارنت‌های نوع آندرادیتی و یا در نوارهایی جداگانه همراه با کوارتز تشکیل شده‌اند. این کانی در متاکرینات‌های ناخالص و در مناطق کوارتزدار در متاکرینات‌ها به وجود آمده است. واکنش تشکیل گارنت نوع آندرادیت همراه با اکتینولیت  $(\text{Ca}_2(\text{Mg}, \text{Fe})_5\text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2)$ ، در برون‌اسکارن‌ها به صورت زیر است:

$$5\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2 + 11\text{SiO}_2 + 7\text{Fe}^{+3}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O} + 4\text{O}_2 \rightarrow \text{Ca}_2(\text{Mg}, \text{Fe})_5\text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2 + \text{Ca}_3\text{Fe}_2\text{Si}_3\text{O}_{12} + 5\text{CO}_2$$

در این واکنش، با ورود سیال به دولومیت  $(\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2)$ ، آندرادیت و اکتینولیت تشکیل می‌شوند. از این واکنش می‌توان به اثر ترکیب سنگ میزبان از نظر مقدار عناصر  $\text{Ca}$ ،  $\text{Mg}$ ،  $\text{Si}$ ،  $\text{Fe}$ ، برای تشکیل مجموعه‌های کانی در لایه‌های جداگانه پی‌برد. برای مثال، لایه‌هایی با ترکیب‌های دولومیت، آمفیبول نوع اکتینولیت دارند. کربنات‌های آندرادیت‌دار و با آندرادیت خودشکل درشت در زمینه‌ای از کلسیت‌های متبلور در شکل ۶ ب، دیده می‌شوند. مرمری‌شدن گاهی در سنگ‌های آهکی نزدیک به توده

دیگر چون وزوویانیت (ایدوکراز)، ولاستونیت و کلسیت هستند. گراندیت به شکل کانی‌های درشت و ریز در لایه‌های مختلف، به شکل انبوهه‌های نیمه شکل‌دار تا بی‌شکل همراه با اپیدوت-های گروه پیستاسیت/کلینوزوئیزیت تشکیل شده‌اند. گارنت‌ها در درون اسکارن‌ها بیشتر از برون اسکارن‌ها منطقه‌بندی شیمیایی نشان می‌دهند که نشانه تزریق پیایی سیال‌ها به پهنه درون اسکارن است (شکل‌های ۷ ب، پ و ت). پراکندگی آن‌ها در سنگ چنان که در شکل ۷ دیده می‌شود، تنها در بخش‌های غنی از آهن است. در این مناطق، فلدسپار کمتری دیده می‌شود. بخش‌های غنی از کوارتز سبز همراه با اکتینولیت فراوان در یک لایه نمایان است. وزوویانیت و اکتینولیت و گاهی ولاستونیت در این بخش از سنگ با فراوانی کمتر دیده می‌شوند. فلدسپات‌های قلیایی و پلاژیوکلازهای آنورتیت-الیگولاژ در متن سنگ نمایان‌اند. کلسیت تنها در بخش‌هایی از سنگ و به شکل بین‌بلوری همراه با کوارتز دیده می‌شود. انبوهه‌های کوارتز سبز در سنگ‌های درون اسکارن وجود دارند.




محلول‌های غنی از Ca در درون اسکارن‌هاست. کلسیم از سنگ آهک با افزایش دما آزاد شده و همراه سیال‌ها به درون سنگ آذرین نفوذ کرده و منجر به تشکیل ولاستونیت می‌شود [۱۴]. واکنش آن به صورت زیر است:



#### درون اسکارن‌ها

سنگ‌های اسکارنی در منطقه‌ای به مساحت ۲۵ کیلومتر مربع و در لایه‌های آهکی و واریزه‌های سنگی، به شکل کانسار پلاسری یافت می‌شوند. وسعت گستره درون اسکارن، به علت تخریب توده‌های آذرین در کناره گنبد، به طور دقیق مشخص نیست. این سنگ‌ها با بافت نواری به شکل سنگ‌هایی غنی از فلدسپار، گارنت و اپیدوت در نمونه دستی قابل تشخیص هستند (شکل ۷ الف).

از نظر میکروسکوپی، سنگ‌های درون اسکارن شامل ۳۰ درصد فلدسپار، ۲۵ درصد کوارتز همراه با اکتینولیت، ۲۰ درصد گارنت‌های گراندیتی، ۲۰ درصد اپیدوت و ۵ درصد کانی‌های



شکل ۷ الف- نمونه سنگ درون اسکارنی دارای گراندیت + اپیدوت + اکتینولیت. ب- گارنت + کلینوزوئیزیت + وزوویانیت به همراه فلدسپار (Ppl)، پ- محل تماس گارنت گروسولاریتی و کلینوزوئیزیت زردرنگ در سنگ (Ppl) و ت- رشد فراوان اپیدوت و فلدسپار پیرامون گارنت‌ها (Xpl).

## زمین شیمی


داده‌های تجزیه ریزپردازشی نمونه سنگ‌های اسکارنی در جدول ۱ ارائه شده‌اند. براساس تجزیه گارنت‌ها، اپیدوت‌ها و ولاستونیت از نمونه سنگ‌های اسکارن، مجموعه کانی‌های همبرزاد و با ترکیب‌های متفاوت در دو پهنه اسکارنی بررسی شدند. بر این اساس، گارنت‌ها در درون اسکارن و برون اسکارن دارای ترکیب بین آندرادیت و گروسولار هستند. این گارنت‌ها اغلب در اسکارن‌های دگرنهاده تشکیل می‌شوند [۱۵]. ترکیب آن‌ها به طور کلی بر نمودار مثلثی گروسولار-پیرالسپیت-

آندرادیت (شکل ۸) نشان داده شده‌اند. مقایسه آن با گستره ترکیبی اسکارن‌های وابسته به کانسارهای فلزی مختلف نشان می‌دهد که ترکیب گارنت‌های مورد بررسی شبیه گارنت‌های مربوط به کانسارهای مس است (شکل ۸). بررسی شیمی بلورهای گارنت نشان می‌دهد که گارنت‌ها در گنبد نمکی زندان از نوع گراندیت و با منطقه‌بندی شیمیایی هستند. این گارنت‌ها دارای عناصری چون منگنز، وانادیوم و روی هستند و مقدار آلومینیوم و تیتانیوم پایینی دارند (جدول ۱).

جدول ۱ نتایج تجزیه ریز پردازشی نمونه‌های سنگی از درون اسکارن و برون اسکارن‌ها.

		SiO <sub>2</sub>	TiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	MnO	MgO	ZnO	K <sub>2</sub> O	CuO	ZrO <sub>2</sub>
LMOG متاکربنات	گارنت	۴۷,۲۳		۴,۷۶	۴۱,۲۳	۶,۱۸		۰,۵۲				۰,۰۴	۰,۰۴
	گارنت	۴۸,۲۱	۰,۱۴	۷,۶۹	۳۸,۸۱	۴,۵۷		۰,۴۷				۰,۰۷	۰,۰۴
	گارنت	۴۸,۷۱			۴۳,۹۴	۶,۸۲		۰,۴۹				۰,۰۴	
	گارنت	۴۸,۳۳		۶,۳۵	۳۹,۷۱	۴,۹۹		۰,۵۳				۰,۰۵	۰,۰۴
	گارنت	۴۹,۸۳		۳,۶۷	۴۰,۵۱	۵,۴۳	۰,۰۴	۰,۴۴				۰,۰۶	۰,۰۳
	ولاستونیت	۴۶,۶۶		۲,۱۳	۴۷,۵۷	۳,۲۴	۰,۰۴	۰,۱۵	۰,۰۸				۰,۰۴
	گارنت	۴۸,۶۳	۰,۱	۷,۰۷	۳۸,۹۵	۴,۷۲		۰,۴۶				۰,۰۵	۰,۰۳
	گارنت	۴۸,۴۴	۰,۱	۸,۰۲	۳۸,۳۹	۴,۵۴		۰,۰۷				۰,۰۱	۰,۰۳
	اپیدوت	۴۴,۲۶		۲۷,۶۳	۲۵,۲۶	۲,۶۵		۰,۰۷					۰,۰۳
	کوارتزسبز	۷۵,۲		۱,۵۷	۱۸,۵۳	۴,۱۶		۰,۲۶	۰,۱۲		۰,۱		
	کوارتزسبز	۷۷,۱۳			۱۸,۳	۴,۰۸		۰,۲۱	۰,۱۲		۰,۱۳		۰,۰۳
	کوارتزسبز	۷۶,۵۱			۱۸,۵۵	۴,۴۷		۰,۲۴	۰,۱۲		۰,۰۸		۰,۰۳
	کوارتزسبز	۷۷,۰۵			۱۸,۲۶	۴,۱۸	۰,۰۳	۰,۲۶	۰,۱۳		۰,۰۹		
Lm11 متاتوفیت	گارنت	۴۸,۱۵			۴۲,۷۵	۷,۳۹		۱,۲۶		۰,۰۵			
	گارنت	۴۸,۵۵			۴۲,۴۴	۷,۱۶	۰,۴	۱,۱۹		۰,۰۴			۰,۰۳
	گارنت	۴۹,۵۲			۴۱,۷۹	۷,۰۸	۰,۳۴	۱,۲		۰,۰۴			۰,۰۳
	گارنت	۴۷,۹۱	۰,۱۱	۳	۴۱	۶,۳۶	۰,۴۹	۱,۱۲		۰,۰۴			۰,۰۳
	گارنت	۴۹,۷۷			۴۱,۶	۶,۹۳	۰,۴۵	۱,۱۴		۰,۰۸			۰,۰۳
	گارنت	۴۸,۹۴			۴۲,۰۲	۷,۱۴	۰,۵۸	۱,۲۱		۰,۰۷			۰,۰۴
	گارنت	۴۹,۰۴			۴۱,۷۳	۷,۱۶	۰,۵۱	۱,۱		۰,۰۷			۰,۰۴
	گارنت	۴۷,۱۳			۴۲,۸۴	۷,۳۲	۰,۴۷	۱,۱۳		۰,۰۸			۰,۰۴
	کوارتزسبز	۷۷,۴			۱۸,۲۱	۳,۲۵		۰,۹۹	۰,۱۳				۰,۰۳
	کوارتزسبز	۷۴,۹۹		۱,۹۲	۱۸,۲۹	۳,۰۵		۱,۰۶	۰,۱۴		۰,۱۱		۰,۰۳
	کلینوزوئیت	۴۴,۰۷		۲۶,۹۲	۲۵,۶۷	۳,۱۵						۰,۰۵	
	کلینوزوئیت	۴۴,۷۳		۲۷,۸	۲۴,۵۵	۲,۷۸		۰,۰۹					۰,۰۳
	پتاسیم فلدسپار	۶۲,۲۷		۱۹,۷۳		۶,۹۴		۰,۰۵			۸,۹۳		۰,۰۲
	گارنت	۴۷,۱۵	۰,۲	۷,۵۸	۳۹,۳	۵,۱۴		۰,۴۲		۰,۱۵			۰,۰۳
	گارنت	۴۹,۰۳	۰,۶۷	۴,۳	۴۰,۳۱	۵,۲۲		۰,۴۲		۰,۱۵			
	گارنت	۴۷,۲۳	۰,۸۱	۶,۱۱	۳۷,۳۲	۴,۷۷		۰,۴۱		۰,۰۵			۰,۰۵
LmC1 متاکربنات	گارنت	۵۱,۴۷			۴۳,۶	۷,۶۹		۰,۴۶		۰,۰۷			
	گارنت	۴۸,۰۳		۰,۳۵	۴۳,۳۸	۷,۱۹		۰,۴۳		۰,۰۸			۰,۰۳
	گارنت	۴۸,۸۶		۰	۴۳,۱۶	۶,۹۲		۰,۴۳					۰,۰۵
	گارنت	۴۸,۲۳		۰	۴۳,۶۲	۷,۰۵		۰,۴۵					۰,۰۴
	گارنت	۴۸,۷۸		۳,۹	۴۰,۷۷	۵,۶۵		۰,۴				۰,۰۵	
Aرگه	گارنت	۴۸,۵۴	۰,۰۶	۶,۲۶	۳۹,۰۷	۵,۳۹	۰,۰۵	۰,۶۳					
	گارنت	۵۰,۵۲			۴۲,۰۴	۷,۰۵		۰,۳۶					۰,۰۳
	گارنت	۴۷,۶۵			۴۲,۲۳	۷,۶۹		۰,۳۹					۰,۰۳
	گارنت	۴۹,۲۹			۴۲,۹۹	۷,۳۲		۰,۳۸					۰,۰۲
	کوارتزسبز	۷۴,۴۶		۳,۱	۱۷,۷	۳,۶۳		۰,۹	۰,۱۳	۰,۰۵			۰,۰۴
	کوارتزسبز	۷۱,۱۳		۴,۶۶	۱۸,۵۳	۴,۱۸		۱,۱۵	۰,۱۲	۰,۰۳	۰,۰۹		





شکل ۸ موقعیت ترکیبی ۲۸ نقطه از گارنت‌های تجزیه شده بر نمودار مثلثی گروسولار- پیرالسپیت- آندرادیت و مقایسه آن با گستره ترکیبی اسکارن‌های وابسته به کانسارهای فلزی مختلف. دیده می شود که ترکیب گارنت‌های مورد بررسی شبیه ترکیب گارنت‌های مربوط با کانسارهای مس است [۱۶].

نوع قابلیت حمل عناصر مختلف فلزی در سیال‌های کانسار ساز می‌تواند سبب تمرکز عناصر در پهنه‌های مختلف شود. گارنت‌ها با ترکیب گروسولاریت در درون اسکارن‌ها یافت می‌شوند که به علت حضور پلاژیوکلازهای کلسیمی و آلومینیوم بیشتر در سنگ میزبان است. گارنت‌های نوع گروسولار با کلینوزوئیزیت‌های زردرنگ همبرزاد هستند (شکل ۹). این امر نیز نشان‌دهنده وجود Al بیشتر در درون اسکارن‌هاست. نتایج تجزیه اپیدوت‌ها و ولاستونیت در درون اسکارن‌ها در جدول ۱ را مشاهده می‌کنید و تصاویر مربوط به تجزیه کانی‌های همبرزاد گروسولار + آندرادیت + کلینوزوئیزیت + ولاستونیت در شکل ۹ آورده شده‌اند.

#### مراحل تشکیل و توالی همبرزایی

بررسی کانی‌شناسی اسکارن نشان می‌دهد که سیال‌های غنی از آهن دارای شرایط خوبی برای کانی‌زایی بوده و توانسته‌اند در فضاهای خالی سنگ‌ها کانی‌سازی کنند. با توجه به الگوی نفوذ سیال‌های در منطقه و برآورد مقدار  $\text{XCO}_2$  و  $\text{XH}_2\text{O}$  در سیال‌های اسکارن ساز، می‌توان به قدرت نفوذ سیال‌های اسکارن ساز پی برد. هر چه حجم سیال‌های و دمای آن‌ها بیشتر باشد، قدرت نفوذ آن‌ها نیز بیشتر است.


گارنت‌های نوع گراندیت دربردارنده اطلاعات بسیاری پیرامون چگونگی تشکیل و تهنشست سیال‌های گرمایی هستند.

بیشتر گارنت‌ها در برون اسکارن و درون اسکارن‌ها دارای ترکیب غالب آندرادیت (غنی از آهن و کلسیم) هستند. از جمله عوامل مؤثر در تشکیل این نوع گارنت‌های دوگانه عبارتند از ۱- تغییرات دوره‌ای در ترکیب سیال [۱۷]، ۲- تغییر شرایط گریزندگی اکسیژن- دما- فشار ( $P-T-fO_2$ ) در سنگ‌ها [۱۸]، ۳- نفوذپذیری بالای ماسه‌سنگ‌ها و توف‌های کربناتی که جریان آسان و تهنشست سریع سیال‌های آهنی را ممکن می‌سازد. با بررسی شیمی بلور، درباره محیط نهشت گارنت‌ها در گنبد زندان می‌توان گفت که ترکیب کانی‌ها در سنگ‌ها به عواملی چون تغییرات ترکیبی سنگ میزبان و نهشت یکباره سیال در درزه‌های سنگ‌ها بستگی دارد. بنابراین تغییرات کمی در شیمی گارنت‌ها و اپیدوت‌ها در سنگ‌های میزبان مختلف دیده می‌شود.

براساس تجزیه ریزپردازشی، که عناصر فلزی و شبه فلزی چون  $\text{Zn}$ ,  $\text{Mn}$ ,  $\text{Al}$ ,  $\text{V}$ ,  $\text{Cu}$ ,  $\text{Mg}$ ,  $\text{Fe}$  در کانی‌های سیلیکاتی آهکی این اسکارن‌ها یافت می‌شوند. این عناصر در درون- اسکارن‌ها مانند نمونه Lm11 و در برون اسکارن‌ها از جمله نمونه‌های LmC1, LMOG و A متفاوت توزیع شده‌اند. مقدار  $\text{CuO}$  در گارنت‌های برون اسکارن‌ها افزایش می‌یابد و اکسیدهایی چون  $\text{ZnO}$ ,  $\text{V}_2\text{O}_5$  و  $\text{MnO}$  در گارنت‌های درون- اسکارن بیشتر هستند. عواملی چون نزدیکی به منبع سیال و

تشکیل می‌شوند (جدول ۲). کانی‌های آبدار چون آمفیبول‌های گروه اکتینولیت-ترمولیت و اپیدوت مربوط به مرحله تبلور کوارتز یعنی مرحله پسرونده اسکارن هستند، زیرا همراه با افزایش  $\text{SiO}_2$  در سیال، مقدار  $\text{H}_2\text{O}$  نیز افزایش می‌یابد. کوارتز و کلسیت از جمله کانی‌های پایانی مراحل اسکارن‌ساز و نیز مرحله قهقرایی هستند.

بر پایه بررسی‌های انجام شده، بیشتر کانی‌ها در مرحله پیشرونده ورود سیال و ته‌نشست آهن متبلور شده‌اند. گارنت نخستین کانی است که در سنگ‌ها متبلور می‌شود و بنابراین بسیاری از ویژگی‌های TPX سیال‌ها و حتی سن دقیق رخداد گرمایی را می‌توان با آن تعیین کرد. آندرادیت، اسفن، وزوویانیت، فلدسپارها، ولاستونیت و حتی کلینوزوئیزیت در درون‌اسکارن از کانی‌هایی هستند که در مرحله پیشرونده



شکل ۹ الف- ترکیب گارنت‌های همبرزاد با کلینوزوئیزیت که نشان‌دهنده ترکیب گروسولاریت برای آن‌هاست (نور طبیعی)، ب- نتایج تجزیه ریز پردازشی کانی‌های گراندیت در درون‌اسکارن‌ها از مرکز به لبه کانی که تغییر ناگهانی ترکیب را نشان می‌دهد (نمونه Lm11) و پ- تشکیل ولاستونیت در بین گارنت‌های نوع آندرادیت به همراه کوارتزسبز که در گوشه سمت چپ بالای تصویر دیده می‌شود (نور طبیعی).

جدول ۲ مراحل تشکیل و توالی همبرزایی کانی‌ها در اسکارن‌های آهن گنبد نمکی زندان.


مرحله قهقرایی	مرحله پسرونده اسکارن	مرحله پیشرونده اسکارن	نام کانی
			گارنت
			کلینوزوئیزیت
			وزوویانیت
			اسفن
			اکتینولیت/ترمولیت
			ولاستونیت
			فلدسپار
			اپیدوت
			کوارتز
			کلسیت

### دماسنجی

برای پی‌بردن به شرایط فیزیکوشیمیایی دقیق اسکارن آهن زندان، سیال‌های درگیر بررسی شدند. در این پژوهش، سیال‌های درگیر موجود در آندرادیت‌ها بررسی شدند. انواع میانبارهای سیال بررسی شده در کانی آندرادیت که در شکل ۱۰ نشان داده شده‌اند، غنی از فازهای سیال و بخار و بیشتر از نوع اولیه و دوفازی بوده‌اند. به علت بیشینه دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد دستگاه و همگن نشدن مواد تشکیل دهنده میانبار تا آن دما، تنها دمای همگن شدگی بالاتر از ۶۰۰ درجه سانتیگراد تشخیص داده شد. این دمایی است که کانی‌های ولاستونیت و فلدسپارها توانسته‌اند در اسکارن مورد بررسی تشکیل شوند. بر اساس این بررسی، دما چه در برون اسکارن و چه در درون اسکارن بالا بوده است. بر پایه یافته مرجع [۱۹]، کانی سری پیستاسیت/کلینوزوئیزیت و واکنش‌های تعادلی میان آن دو، در ۰/۳ گیگاپاسکال و دمای ۵۰۰ تا ۶۵۰ درجه سانتیگراد پایدار


است. این کانی چنان که گفته شد در گستره درون اسکارن و در توده نفوذی دیده شده‌است.

براساس نمودار  $T-fO_2$  برای تعیین دمای اسکارن (شکل ۱۱)، در دمای بالاتر از ۵۸۰ درجه سانتیگراد و با حضور مقدار بالای کوارتز، هدنبه‌ژیت با آندرادیت جایگزین شده و ولاستونیت تشکیل می‌شود. بر پایه این نمودار،  $fO_2$  بیش از ۲۲- و دماهای بالاتر از ۵۰۰ درجه سانتیگراد، گستره پایداری ولاستونیت به جای کلسیت و کوارتز است. شرایط دما و فشار تنها محدود به سنگ‌های مورد بررسی نیست و برای درک چگونگی رخداد، افزون بر آگاهی از کانی‌های همبرزاد در مجموعه اسکارنی، می‌باید به همه عوامل از جمله تغییرات بافتی در سنگ‌میزبان و لبه‌های توده‌های آذرین نیز توجه شود. برای مثال، برون اسکارن‌های یافت‌شده در بین لایه‌های سنگی دمای کمتری از درون اسکارن‌های دارای ولاستونیت، گراندیت و کلینوزوئیزیت داشته‌اند.



شکل ۱۰ سیال‌های درگیر در کانی گارنت نوع آندرادیت. میانبار دو فاز غنی از مایع آبگین و بخار. این میانبارها اولیه بوده و در راستای زوایای خطوط رشد گارنت دیده شده‌اند.





شکل ۱۱ نمودار سامانه Ca-Fe-Si-C-O-H و تعیین شرایط دمایی در برون‌اسکارن‌های گنبدنمکی زندان. مربع نشان‌دهنده مجموعه کانیایی، Ad: آندرادیت؛ Hd: هدنبرژیت؛ Qtz: کوارتز و Wo: ولاستونیت است [۲۰].

#### برداشت

از بررسی مجموعه سنگ‌های اسکارنی زندان نتایج زیر به دست آمد:

۱. اسکارن‌های موجود در گنبد نمکی زندان بیشتر از نوع کلسیمی آهن‌دار هستند و در لایه‌های سنگی کربناتی چون ماسه‌سنگ‌ها و توفیت‌های آهکی، آهک‌های دولومیتی و در کنار آهن‌زایی و کانسار مس دیده می‌شود.

۲. مجموعه کانی‌ها در درون‌اسکارن‌ها و برون‌اسکارن‌ها از نظر گروه‌های کانی بسیار شبیه هستند، ولی از نظر عناصر شیمیایی تفاوت نشان می‌دهند. مجموعه کانی‌ها شامل گراندیت + اپیدوت + اکتینولیت و گاهی ولاستونیت و وزوینایت (ایدوکرز) هستند. گاهی سنگ‌های اسکارنی غنی از فلدسپارها هستند که نشان‌دهنده تشکیل اسکارن در سنگ‌های درون‌اسکارن است.

۳. اسکارن‌های آهن مورد بررسی از نظر مراحل تشکیل در مرحله اسکارن پیشرونده طی دگرگونی مجاورتی شامل دو

مرحله پیشرونده که کانی‌های غنی از آهن در آن شکل می‌گیرند و پسرونده که رگچه‌های کوارتز و کلسیت سنگ را فرا می‌گیرند هستند.

۴. بر اساس بررسی‌شیمی بلور، گارنت‌ها در درون‌اسکارن‌ها و نیز برون‌اسکارن‌ها بیشتر ترکیب آندرادیتی دارند. گارنت در درون‌اسکارن گاهی ترکیب گروسولار نیز دارد که به علت وجود آلومینیوم بالا در محیط است. بنابراین ترکیب‌های غنی از گروسولار با کانی‌های غنی از آلومینیوم چون اپیدوت‌های سری پیستاسیت/کلینوزویزیت و آنورتیت همراه هستند. گارنت در برون‌اسکارن‌ها به صورت آندرادیت‌های درشت گاهی همراه با اکتینولیت و پیستاسیت یافت می‌شود.

۵- بر طبق بررسی پراکندگی زمین شیمیایی عناصر در کانسار اسکارنی، سیال‌های اسکارن‌ساز غنی از آهن و به مقدار کمتر عناصر فلزی ماگمازاد چون مس، وانادیوم، منگنز، زیرکونیوم و روی هستند. مقدار بالای اکسید مس در برخی از گارنت‌ها به

- [7] O'Brien, G.D., "Survey of diapirs and diapirism". *Memoir, American Association of Petroleum Geologists*, 1968.
- [8] Gansser, A., "The enigma of the Persian salt dome inclusions, *Symposium on Swiss Molasse Basin*", 1992, p 825-846.
- [9] Kent P.E., "The salt of the Persian Gulf region". *Trans. Leics. Lit. Philos. Soc.*, 1970, 64, 56-88.
- [10] Edgell H. S., "Salt tectonism in the Persian Gulf Basin", *Geological Society, London, Special Publications*, 1996, 100, 129-15
- [11] Talbot, C.J. & Alavi, M., "The past of a future syntaxis across the Zagros". In: Alsop, G.I., Blundell, D. & Davison, I. (eds) *Salt Tectonics*. Geological Society, London, *Special Publications*, 1996, 100, 89-109.
- [12] Bosak P., Jaros J., Spudil J., Sulovsky P. and Vaclavek V., "Salt Plugs in the Eastern Zagros, Iran: Results of regional geological reconnaissance", *GeoLines*, 1998, 7, 3-174.
- [13] Jahani S., Callot J.P., Letouzey J., Dominique Frizon de Lamotte, "The eastern termination of the Zagros Fold-and-Thrust Belt, Iran: Structures, evolution, and relationships between salt plugs, folding, and faulting", *Tectonics*, 2009, 28, p. 22.
- [14] Sheibi M., "Mineralisation and petrogenesis of Chaloo iron skarn deposit, SE Damghan", *Crystallography and Mineralogy Magazine*, 2016, n 24, 449-460.
- [15] Becker U. and Pollok K., "Molecular simulations of interfacial and thermodynamic mixing properties of grossular-andradite garnets", *Phys Chem Minerals*, 2002, 29, 52-64.
- [16] Meinert, L.D., "Skarns and skarn deposits". *Geoscience Canada*, 19, 1992, 145-162.
- [17] Jamtveit, B., "Oscillatory zonation patterns in hydrothermal grossular-andradite garnet: nonlinear dynamics in regions of immiscibility", *American Mineralogist*, 1991, 76, 1319-1327.
- [18] Jamtveit, B., Wogelius, R.A., Fraser, D.G., "Zonation patterns of skarn garnets: Records of hydrothermal system evolution", *Geology*, 1993, v. 21, 113-116.
- [19] Fehr K.T. and Heuss-Aßbichler S., "Intracrystalline equilibria and immiscibility

ویژه در برون اسکارن‌ها نشان‌دهنده ارتباط آن‌ها با کانسار مس یافت‌شده پیرامون توده‌های دیابازی است.

۶. بر اساس بررسی سیال‌های درگیر در بلور آندرادیست، دمای سیال‌های داغ غنی از آهن ۶۰۰ تا ۶۵۰ درجه سانتیگراد است. با توجه به یافته‌های دماسنجی، اسکارن‌های آهن زندان شرایط دمایی بالا مانند نفوذ سیال‌های داغ ماگمازاد در فضاهای خالی را پشت سر گذاشته‌اند.

#### قدردانی

از راهنمایی‌های ارزشمند خانم دکتر هویس، خانم دکتر پشت کوهی و آقای دکتر صادقان تشکر می‌کنیم و همچنین قدردان زحمات آقای سلیمانی هستیم.

#### مراجع

- [1] Aghanabati A., *Geological of Iran, Geological Survey and Mineral Exploration of Iran*, 2004, 707.
- [2] Biabangard H., Alian F. and Bazamad M., "Petrography, mineralization and mineral explorations in the Zendan salt dome (Hara), Bandar Lengeh", *Journal of Economic Geology*, V. 10, No. 1, 2018, 24.
- [3] Daryanavard A., Bonyadi Z., Rahmani S., "Investigation and the genesis of alterations of Zendan salt dome by satellite datas", 2018, 26<sup>th</sup> Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran (SCMI). 8.
- [4] Attapour, H. and Aftabi, A., "New mode Rapitan banded iron for Hormoz iron deposit. Bandar Abbas. 33<sup>th</sup> national geosciences symposium, Geological Survey and Mineral Exploration of Iran", Tehran, Iran. 2011.
- [5] Ahmadzadeh Heravi, M., Houshmandzadeh, A. and Nabavi, M.H., "New concepts of Hormuz formations, stratigraphy and the problem of salt diapirism in south of Iran". *International Journal of Geosciences*, 1991, 3(7):1- 22.
- [6] Ala M.A., "Salt diapirism in southern Iran", *American Association of Petroleum Geologists Bulletin* 58, 1974, 1758-1770.

- [20] Einaudi, M.T., "General features and origin of skarns associated with porphyry copper plutons: Porphyry Copper Deposits", Am. Adv. Geol, 1982a, p.p 185-209.
- along the join clinozoisite- epidote: An experimental and  $^{57}\text{Fe}$  Mössbauer study", N. Jb. Miner.Abh, 1997, 172, 43-67.